

## Kontraindikacije

### Apsolutne kontraindikacije:

- tromboflebitis ili tromboembolijski poremećaji
- cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti
- bolesti i tumori dojke
- bolesti i tumori jetre
- maligni tumori
- nervna oboljenja
- endokrine bolesti
- sumnja na trudnoću i trudnoća i dojenje
- nerazjašnjena krvarenja iz genitalnog trakta
- povišen krvni pritisak (160/100mmHg)
- sistemske bolesti
- glavobolja sa fokalnim neurološkim simptomima
- žene pušači starije od 35 godina



### Relativne indikacije

- puerperij kraći od tri sedmice
- dijabetes
- tuberkuloza
- teške infekcije urinarnog trakta
- proširene vene
- žene pušači starije 35 godina
- žene nepušači starije do 40 godina
- adolescentice
- ozbiljne glavobolje
- prebolovan hepatitis
- žučni kamenci

Noviji stavovi u vezi sa godinama se svakodnevno mijenjaju, tako da sada je uslov za primjenu kontraceptivnih tableta kod adolescentica samo tri redovne menstruacije, a da ih mogu koristiti i žene preko 40 godina koje nemaju drugih rizika. S obzirom na rizik od tromboembolije preporučuje se prekinuti sa uzimanjem tableta prije planiranih operativnih zahvata kao i prije dugih prekontinentalnih letova.