

POSTKOITALNA KONTRACENCIJA

Postkoitalna kontracepcija (hitna ili kontracepcija u nuždi, pil after, pil in the morning) zauzima posebno mjesto jer se primjenjuje neposredno nakon nezaštićenog odnosa. U tu svrhu se mogu koristiti kombinirani estrogensko-gestagenski preparati, sami progestageni i sami estrogeni. Antiprogesteron Ru-486 (mifepriston) se takođe može primijeniti u ove svrhe u dozi od 600mg. Insercija IUU kao post-koitalno kontraceptivno sredstvo dolazi u obzir do pet dana nakon nezaštićenog odnosa ali pod uslovima koji važe intrauterinu kontracepciju.

Posljednjih godina su u svijetu registrovani preparati za ovu primjenu (slika br. 19). Oni sadrže 4 tablete čiji je sastav sličan standardnim ali je koncentracija hormona dva puta veća. Dvije tablete se trebaju popiti što prije nakon nezaštićenog odnosa a najkasnije 72h. Treća tableta se popije 12h poslije a četvrta 12h nakon treće. Upotreba standardnih kontraceptivnih preparata zavisi od vrste gestagenske komponente ali bi ukupna doza npr. levonorgestrela trebala biti 1,5mg.



Slika br. 19. Postkoitalna hormonska kontracepcija